

INFORME SEMANAL
22 AL 28 DE ABRIL 2024 (Elaborado el 29/04/2024)

Resumen:

Durante la semana, las temperaturas mínimas experimentaron un notable aumento. Aunque los mayores acumulaciones de precipitación se concentraron en el este provincial, lluvias y lloviznas afectaron a toda la provincia, persistiendo así el retraso en la cosecha. El estado de los cultivos varía según la zona, pero diversos factores climáticos y biológicos, como la presencia del vector chicharrita, el hongo ergot y los rebrotes, han influido en la producción agrícola, potencialmente afectando la calidad del producto final.



Precipitaciones:

Durante la semana, la provincia experimentó condiciones atmosféricas caracterizadas por una inestabilidad persistente, lo que ocasionó la presencia de precipitaciones, principalmente en forma de lluvias y lloviznas. Las estaciones meteorológicas que registraron los mayores acumulados de precipitación fueron las siguientes: Libertador General San Martín: Pampa del Indio (MPDES) con 98.2 mm, Bermejo: Tres Horquetas Cangui G (RCB) con 105.0 mm, Gral Vedia (RCB) con 110.0 mm, Cabral Cue (RCB) con 115.0 mm, Puerto Bermejo Nuevo (APA) con 123.0 mm, Las Rosas (RCB) con 123.0 mm, El Moncholo (RCB) con 134.0 mm, Pto Bermejo - Km90 (RCB) con 155.0 mm, Las Palmas (MPDES) con 177.2 mm, General Donovan: La Escondida (APA) con 193.0 mm, La Verde (APA) con 202.0 mm, y en Libertador General San Martín: Selva del Río de Oro (MPDES) con 249.2 mm.


Temperaturas:

Las temperaturas máximas promedio se mantuvieron estables con respecto a la semana pasada, mientras que las temperaturas mínimas promedio aumentaron en un rango de 5 a 8 grados Celsius. En el sector Este, las temperaturas medias alcanzaron un máximo de 28.4°C y un mínimo de 20.4°C. En el área productiva, se registraron temperaturas medias máximas de 28.9°C y mínimas de 17.5°C. Por otro lado, en el sector Noroeste, las temperaturas medias máximas fueron de 30.9°C y las mínimas de 16.3°C.


Pronóstico:




Precipitaciones Acumuladas Semanal



Temperatura Máxima Promedio Semanal



Temperatura Mínima Promedio Semanal



Maíz: El cultivo se ha visto afectado por una combinación de factores adversos, como temperaturas extremas, estrés hídrico y la presencia de vectores como la chicharrita, especialmente durante etapas críticas como la floración. Estas condiciones han llevado a una situación en la que la recuperación del maíz se vuelve irreversible, resultando en pérdidas considerables.



Sorgo: Aunque existe preocupación por la presencia de hongos en las zonas de cultivo, se prevé un escenario de recuperación prometedor. Se estima que algunos lotes alcanzarán rendimientos que van desde los 1000 hasta los 3000 kg/ha. Es importante destacar que la aparición del hongo ergot se debe a una infección específica en la flor, con síntomas distintivos como la presencia de una melaza pegajosa.



Soja: Las precipitaciones recientes han generado dificultades en el avance de la cosecha, lo que ha resultado en una notable disminución en la calidad del grano. Los rendimientos oscilan entre 600-700 kg/ha y se observa una calidad deficiente. Además, debido a la siembra escalonada en diferentes áreas productivas, la maduración fisiológica necesaria aún no se ha completado en algunas regiones. Los rendimientos pueden variar desde los 300 kg/ha hasta los 3000 kg/ha, dependiendo de las condiciones locales. En la actualidad, la prioridad es cosechar lo disponible, lo cual representa un desafío debido a las precipitaciones recientes. La disponibilidad futura de maquinaria podría ser un inconveniente si no se avanza pronto en esta tarea.



Algodón: Las condiciones climáticas recientes, incluidos los temporales de lluvias y lloviznas, han generado rebrotes significativos en cada lote, complicando la cosecha. Los rendimientos varían según la región, con lugares como Castelli alcanzando alrededor de 1100 kg/ha, pero con una calidad muy baja. En otras áreas, como San Martín, se logran rendimientos ligeramente superiores, alrededor de 2400 kg/ha, aunque también se enfrentan a dificultades debido al rebrote provocado por las condiciones ambientales.

Fuente: Red de Estaciones del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dirección de Apoyo Territorial y Agencias. Oficina de Riesgo Agropecuario.