

Resumen:

La llegada de aire frío está consolidando la reducción en la disponibilidad de agua. Se observa un predominio de vientos del sector sur en los últimos días, aunque ocasionalmente se alternan con vientos del este noreste. En promedio, se está estableciendo un patrón de flujo de aire que marca el inicio de la transición estacional.

A pesar de que no se han registrado heladas tempranas, los últimos días de mayo han sido más fríos de lo habitual. En ciertas áreas, las temperaturas mínimas han descendido hasta los 3°C, y es posible que durante esta semana haya ocurrido alguna helada agrometeorológica.

Se estima que las condiciones para la siembra de cultivos de invierno serán notablemente mejores que las experimentadas durante la cosecha de cultivos de verano.

Precipitaciones:

Esta semana no se han observado precipitaciones en la provincia. Las condiciones meteorológicas experimentaron un cambio que ha permitido resolver progresivamente los problemas asociados al exceso de lluvias acumulado de las últimas semanas.

Recomendaciones al productor:

Trigo: antes de la siembra realizar monitoreos para el gusano blanco, confirmar presencia, cantidad y especie, y diseñar estrategias de control efectivas, ya que es una plaga desafiante para los cultivos de invierno. **Monitoreo:** se deben cavar pozos de 50 cm2 y 30 cm de prof., se cuenta el nro de gusanos y se extrapola a 1 m2. En áreas con más de cinco gusanos de bicho torito/m2, el riesgo de daño a los cultivos es alto, por lo que es esencial implementar estrategias de control. Los lotes con antecedentes tienen una mayor predisposición a sufrir ataques.

Maíz: Se recomienda implementar vacíos sanitarios de más de 90 días, reducir las pérdidas por cosecha que ocasionan una cantidad considerable de plantas voluntarias, especialmente en regiones con alta incidencia de enfermedades. Además, se sugiere evitar la siembra escalonada y concentrar los períodos de siembra en intervalos de 30 días.

Algodón: Es fundamental implementar un manejo integrado de plagas a lo largo del ciclo del cultivo, que involucre el uso de trampas para monitorear y controlar las plagas. Además, resulta crucial eliminar el rastrojo mediante la destrucción de la planta, que la planta no quede viva para rebrotar, con el fin de prevenir la proliferación y propagación del picudo.

