

Resumen:

Durante la semana, se ha registrado un descenso en las temperaturas mínimas y máximas debido al ingreso de un frente frío. Aunque los mayores acumulaciones de precipitación se observaron en el este de la provincia, lluvias y lloviznas afectaron ampliamente la región, persistiendo así el retraso en la cosecha de diversos cultivos. El estado de los cultivos varía según la zona, pero distintos factores climáticos y biológicos, como la presencia del picudo en el algodón, el hongo ergot en el sorgo, y los rebrotes en el algodón, han incidido en la producción agrícola, potencialmente comprometiendo la calidad del producto final.





Precipitaciones:

Durante la última semana, persistieron las lluvias y lloviznas en gran parte de la provincia, dejando acumulaciones moderadas de precipitación. Los mayores registros se observaron en el este provincial, especialmente en Colonia La Amalia (MPDES) con 90.8 mm, Margarita Belén (APA) con 67 mm, El Tropezón (MPDES) con 59.2 mm, EEA Col Benítez (INTA) con 55 mm, Makallé (APA) con 49 mm, Colonia Benítez (APA) con 48 mm y Resistencia Aero (SMN) con 41.3 mm.

Temperaturas:

Las temperaturas máximas promedio han disminuido 1.2°C, mientras que las mínimas promedio descendieron entre 2°C y 3°C. En el sector Este, las temperaturas medias alcanzaron un máximo de 27.5°C y un mínimo de 17.7°C. En el área productiva, se registraron temperaturas medias máximas de 26.6°C y mínimas de 15.4°C. Por otro lado, en el sector Noroeste, las temperaturas medias máximas fueron de 27.6°C y las mínimas de 17.7°C.

Pronóstico:



Soja: Las lloviznas intermitentes que han afectado a la provincia han tenido un impacto directo en el cultivo de soja, resultando en granos severamente deteriorados y una notable disminución en la calidad del producto agrícola. Se espera que, con la mejora de las condiciones ambientales, las vainas puedan abrirse rápidamente, lo que podría provocar su apertura antes de la cosecha y su caída al suelo, resultando en la consiguiente pérdida de kilogramos de cosecha.



Algodón: Durante la última semana de abril, el clima adverso persistió, con días de tormenta intercalados con lluvias y lloviznas, lo que complicó el acceso de los agricultores a la cosecha en los campos. En la región de Castelli, donde se esperaba un rendimiento de alrededor de 1500 kg/ha, este se redujo a 1000 kg/ha debido a las condiciones ambientales desfavorables persistentes, lo que resultó en la producción de algodón de calidad grado E, e incluso F. Estos productos se están comercializando a precios muy bajos. En los lotes sembrados más tarde, se observa la presencia del picudo y sigue el rebrote, afectando principalmente a los lotes ya defoliados de surco estrecho.



Maíz: Dadas las adversidades enfrentadas por este cultivo, la situación está clara. En este momento, se está evaluando el rendimiento y se está considerando si es más beneficioso optar por la producción de rollos o la cosecha del grano. Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que los maíces que previamente fueron afectados por la sequía y la presencia de chicharritas muestran signos preocupantes.

Sorgo: Tras el temporal, los campos se han recuperado de manera satisfactoria; no obstante, los agricultores señalan daños ocasionados por la presencia de cotorras y palomas, un inconveniente que empieza a suscitar preocupación. En determinadas áreas, los rendimientos ya están definidos, y ahora queda por decidir entre la producción de silo o la cosecha de grano.