

**Resumen:**

Durante la semana, se han observado fluctuaciones en las condiciones meteorológicas. Inicialmente, se registraron temperaturas inferiores a 3° C, lo que causó heladas agrometeorológicas y meteorológicas en el sudoeste, debido a la llegada de masas de aire frío. Posteriormente, las temperaturas aumentaron con la llegada de vientos del noreste. Además, no se han registrado precipitaciones, lo que ha provocado una significativa disminución en la disponibilidad de agua.

Las condiciones favorables han agilizado la cosecha de varios cultivos, que se habían retrasado debido a las lluvias anteriores a esta semana. Se espera que la cosecha de soja y algodón termine en las próximas días, dejando solo maíz y sorgo por recolectar. Además, se ha iniciado la siembra de trigo en lotes con buenos niveles de humedad, con perspectivas positivas, siempre que no haya escasez de agua en el suelo.

Precipitaciones:





Durante la última semana, no se han observado acontecimientos destacados en términos de acumulaciones.

Temperaturas:

La temperatura media semanal fue de 14.2°C, con una temperatura media máxima de 22.7°C y temperatura mínima promedio de 5.8°C. Durante la semana, debido al ingreso de un frente frío desde el sudoeste, se experimentaron heladas tanto agrometeorológicas como meteorológicas, especialmente hacia el oeste de la provincia. En la estación de Taco Pozo, el día 28 de mayo se registró la temperatura mínima semanal más baja, alcanzando los -3.4°C.

Desde el viernes 30, vientos provenientes del noreste ingresaron en la provincia, ocasionando un incremento gradual de la temperatura. En la estación de Fuerte Esperanza, el día 02 de junio se alcanzó la temperatura máxima semanal más elevada, llegando a los 33.9°C.

Pronóstico:



ESTADO DE LOS CULTIVOS



**Soja:** Gracias a las condiciones meteorológicas favorables de las últimas semanas, se ha logrado avanzar rápidamente con la cosecha, permitiendo un progreso sostenido. En la región de Charata y Castelli, la cosecha está llegando a su fin. Sin embargo, en general, todas las localidades han enfrentado desafíos debido a las lloviznas y neblinas, que han provocado la aparición de manchas foliares al final del ciclo. Estos factores han impactado negativamente en los rendimientos, que en promedio son bajos, con un alto porcentaje de daños en las semillas. Por ejemplo, en San Martín, los rendimientos promedian 800 kg por hectárea.



**Maíz:** En las distintas áreas productivas se ha dado inicio a la cosecha, aunque una cantidad limitada de grano húmedo. Los rendimientos varían significativamente entre los lotes, con muchos campos produciendo entre 1.400 y 2.500 kg por hectárea. Sin embargo, algunos lotes excepcionales han logrado superar los 4.000 kg por hectárea, lo que demuestra un rendimiento notable a pesar del panorama poco alentador que se estimaba debido las condiciones que atravesó el cultivo durante su ciclo, sin embargo hay lotes que han logrado eludir este conflicto.



**Sorgo:** En regiones como Charata, la cosecha ha comenzado con rendimientos que oscilan entre 2.800 y 4.500 kg por hectárea. En San Martín, el sorgo se encuentra en la etapa 7 (grano lechoso) y consumido por aves, por lo que algunos productores optan por picarlo y utilizarlo como forraje para animales.

**Trigo:** En los lotes que presentan un perfil de humedad favorable, es el momento óptimo para comenzar la siembra. Charata y sus alrededores lleva aproximadamente 10 días en ésta práctica.

**Fuente:** Red de Estaciones del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dirección de Apoyo Territorial y Agencias.